



Preventive Health Guidelines for Pregnancy

| | Preconception | 6-8 Weeks | 14-16 Weeks | 24-28 Weeks | 32 Weeks | 36 Weeks | 38 Weeks | 39 Weeks | 40 Weeks | 41 Weeks | Postpartum ¹ |
|-------------------------------------------|---------------|-----------|-------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------------|
| HISTORY | | | | | | | | | | | |
| Medical | ● | | | | | | | | | | |
| Psychosocial | ● | | | | | | | | | | |
| Update Medical/Psychosocial | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| PHYSICAL EXAM | | | | | | | | | | | |
| General | ● | | | | | | | | | | |
| Blood Pressure/Pulse | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Height | ● | | | | | | | | | | ● |
| Weight | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Height/Weight Profile | ● | | | | | | | | | | ● |
| Pelvic Exam/Pelvimetry | ● | ● | | | | | | | | | ● |
| Breast Exam | ● | ● | | | | | | | | | ● |
| Fundal Height | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Fetal Position/Heart Rate | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Cervical Exam | | | | | | | | | | ● | ● |
| Postpartum Visit 3-8 Weeks After Delivery | | | | | | | | | | | ● |
| LAB TESTS | | | | | | | | | | | |
| Hemoglobin or Hematocrit | ● | ● | | ● | | | | | | | ● |
| RH Factor | ● | | | | | | | | | | |
| Pap Test | ● | | | | | | | | | | ● |
| Diabetic Screen | | | | ● | | | | | | | |
| MSAFP | | | ● | | | | | | | | |
| Urine Dipstick | ● | | | | | | | | | | |
| Protein | ● | | | | | | | | | | |
| Sugar | ● | | | | | | | | | | |
| Urine Culture | | ● | | | | | | | | | |
| Infections | | | | | | | | | | | |
| Rubella Titer | ● | | | | | | | | | | ● |
| Anti-D Immune Globulin | | | | | | | | | | | ● |
| Syphilis Test | ● | | | | | | | | | | |
| Gonococcal Culture | ● | ● | | | | | | | | | |
| Hepatitis B | ● | | | | | | | | | | |
| HIV | ● | ● | | | | | | | | | |
| Strep B | | | | | | ● | | | | | |
| Illicit Drug Screen | ● | | | | | | | | | | |
| INFLUENZA² | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| RISK ASSESSMENT* | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| HEALTH PROMOTION* | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |

*See companion chart listing guidelines for Risk Assessment and Health Promotion. ¹Guidelines For Perinatal Care, 5th Edition, American Academy of Pediatrics & The American College of Obstetrics and Gynecology, October 2002. ²The Advisory Committee for Immunization Practices (ACIP) recommends that pregnant women in their second or third trimester during influenza season should be vaccinated (December 2003). Adapted from "Caring for Our Future: The Content of Prenatal Care - A report of the Public Health Service Expert Panel on the Content of Prenatal Care, 1989; Public Health Service Department of Health and Human Services" (Rev 12/2010) 6111NM0111

Normas Preventivas para la Salud durante el Embarazo

| | Preconcepción | De 6 a 8 Semanas | De 14 a 16 Semanas | De 24 a 28 Semanas | 32 Semanas | 36 Semanas | 38 Semanas | 39 Semanas | 40 Semanas | 41 Semanas | Después del parto ¹ |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------|
| ANTECEDENTES | | | | | | | | | | | |
| Médica | ● | | | | | | | | | | |
| Psicosocial | ● | | | | | | | | | | |
| Poner al Día lo Médico y lo Psicosocial | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| EXAMEN FÍSICOS | | | | | | | | | | | |
| En General | ● | | | | | | | | | | |
| Presión Arterial y Pulso | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Estatura | ● | | | | | | | | | | ● |
| Peso | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Características Generales de Estatura y Peso | ● | | | | | | | | | | ● |
| Examen Pélvico y Pelvimetría | ● | ● | | | | | | | | | ● |
| Examen de los Senos | ● | ● | | | | | | | | | ● |
| Medida del Fondo del Utero | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Posición Fetal y Velocidad de los Latidos del Corazón | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Examen Cervical | | | | | | | | | | ● | ● |
| Visita de Después del parto, de 3 a 8 Semanas después de Dar a Luz | | | | | | | | | | | ● |
| PRUEBAS DE LABORATORIO | | | | | | | | | | | |
| Hemoglobina o Hematócrito | ● | ● | | ● | | | | | | | ● |
| Factor RH | ● | | | | | | | | | | |
| Prueba del Cáncer Cervical ["Papanicolau"] | ● | | | | | | | | | | ● |
| Examen de Detección Diabética | | | | ● | | | | | | | |
| MSAFP | | | ● | | | | | | | | |
| Prueba de la Orina con Tira Reactiva | ● | | | | | | | | | | |
| Proteína | ● | | | | | | | | | | |
| Azúcar | ● | | | | | | | | | | |
| Urocultivo | | ● | | | | | | | | | |
| Infecciones | | | | | | | | | | | |
| Concentración de Rubéola | ● | | | | | | | | | | ● |
| Globulina de Inmunidad Anti-D | | | | | | | | | | | ● |
| Prueba de Sífilis | ● | | | | | | | | | | |
| Cultivo Gonococal | ● | ● | | | | | | | | | |
| Hepatitis B | ● | | | | | | | | | | |
| VIH | ● | ● | | | | | | | | | |
| Estreptococo B | | | | | | ● | | | | | |
| Examen de Detección de Drogas Ilícitas | ● | | | | | | | | | | |
| INFLUENZA² | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS* | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| PROMOCIÓN DE LA SALUD* | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |

* Refiérase a la tabla acompañante que enumera las normas para la "Evaluación de los Riesgos y la Promoción de la Salud"

¹ Normas para la Atención Perinatal ["Guidelines For Perinatal Care"], 5a Edición, Academia Americana de Pediatría y Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología, octubre de 2002

² El Comité Consultivo de las Prácticas de Inmunización (CCPI) recomienda que las mujeres en su segundo o tercer trimestre de embarazo se vacunen durante la temporada de la gripe o influenza (diciembre de 2003). Adaptado de "Caring for Our Future: The Content of Prenatal Care - A report of the Public Health Service Expert Panel on the Content of Prenatal Care," [Cuidando Nuestro Futuro: El Contenido del Cuidado Prenatal: Un Informe del Panel de Expertos sobre el Servicio de la Salud Pública referente al Cuidado Prenatal] 1989; Oficina del Servicio de la Salud Pública, Departamento de Servicios Humanos y de Salud (Revisado y ampliado 12/2010) 6111NM0111

| Risk Assessment Activities | Preconception or First Pregnancy Visit | Routine Prenatal Visit | Routine Postpartum Care |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| History | <ul style="list-style-type: none"> • Socio-demographic • Psychological • Menstrual/gynecologic • Contraceptive and sexual • Past obstetric • Medical and surgical • Genetic - individual, spouse, and family • Nutrition • Behavioral • Environmental and/or work hazards • Current pregnancy to date | <ul style="list-style-type: none"> • Pregnancy history to date • Problems or danger signs since last visit • Ability to follow recommendations or treatments | <ul style="list-style-type: none"> • Update physical and psychosocial status of mother and newborn |
| Physical Exam | <ul style="list-style-type: none"> • General appearance and nutrition • Blood pressure, pulse • Height to weight profile, present weight • Head and neck • Heart and lungs • Breasts • Abdomen • Pelvic area tenderness • Extremities and back • Neuromuscular • Pelvic exam | <ul style="list-style-type: none"> • General appearance and nutrition • Blood pressure • Weight, including pattern of weight gain • Abdominal assessment (see fetal evaluation) • Cervical check after 40 weeks | <ul style="list-style-type: none"> • Schedule postpartum visit with health care practitioner 3 – 8 weeks after delivery • Height/Weight Profile • Pelvic Exam/Pelvimetry • Breast Exam • Cervical Exam |
| Lab Tests | <ul style="list-style-type: none"> • Hemoglobin or hematocrit • Blood Rh, Rh negative titer, antibody screen • Rubella titer • Serology • Pap smear • Urine protein and glucose • Urine screen for urinary tract infection, kidney disease • Gonorrheal smear • Hepatitis B titer • HIV titer • Drug toxicology • Screening as indicated for toxoplasmosis tuberculosis, herpes simplex varicella, chlamydia, hemoglobinopathies, Tay Sachs | <ul style="list-style-type: none"> • Maternal serum alpha-fetoprotein • Repeat hematocrit or hemoglobin • Diabetes screen • Serology • Other tests on indication | <ul style="list-style-type: none"> • Rubella vaccine if susceptible to rubella virus infection • Postpartum measurement of hemoglobin or hematocrit • ABO blood group and Rh D type are known, and if indicated, the appropriate amount of anti-D immune globulin administered |
| Fetal Evaluation | <ul style="list-style-type: none"> • Confirm gestational age (LMP, uterine size) • Auscultation of fetal heart after 8 weeks | <ul style="list-style-type: none"> • Confirm gestational age • Fundal height measurements for fetal growth • Fetal lie, position, presentation, weight as term approaches | |
| Health Promotion Activities | | | |
| Counseling to Promote and Support Healthful Behaviors | <ul style="list-style-type: none"> • Nutrition • Smoking cessation • Avoidance of alcohol • Importance of folic acid • Avoidance of illicit drugs • Avoidance of teratogens • Safer sex | <ul style="list-style-type: none"> • Nutrition • Avoidance of teratogens • Maternal seatbelt use • Safer sex • Support for smoking cessation • Work counseling | <ul style="list-style-type: none"> • Postpartum counseling • Postpartum activity and exercise • Common postpartum discomforts and relief measures • Nutrition counseling especially if breastfeeding • Postpartum depression *Administer Postpartum Depression screening tool if indicated • Newborn care counseling • Infant car seat use • Bathing newborns • Care of umbilical cord • Family support upon discharge • Family planning |

Risk Assessment and Health Promotion for Pregnancy

| Risk Assessment Activities | Preconception or First Pregnancy Visit | Routine Prenatal Visit | Routine Postpartum Care |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| General Knowledge of Pregnancy and Parenting | <ul style="list-style-type: none"> • Physiologic and emotional changes of pregnancy • Sexuality counseling • Fetal growth and development • Self-help strategies for common discomforts • Early pregnancy classes | <ul style="list-style-type: none"> • Physiologic and emotional changes of pregnancy • Sexuality counseling • Fetal growth and development, activity patterns • General health habits • Self-help strategies for common discomforts • Promotion of breastfeeding • Infant car seat safety • Childbirth preparation classes • Parenting preparation classes • Encourage questions about labor and birth process • Infant care review • Family roles and adjustment review | <ul style="list-style-type: none"> • SIDS prevention • Family planning • Parenting education • General health habits • Breastfeeding support • Infant/children's car seat safety • Family roles and adjustments |
| Information on Proposed Care | <ul style="list-style-type: none"> • Need for early entry into prenatal care • Preparation for screening and diagnostic tests • Content and timing of prenatal visits needed • Need to report danger signs immediately | <ul style="list-style-type: none"> • Pattern and content of visits • Laboratory tests • Need to report danger signs • Signs and symptoms of preterm labor • Birth plan, expectations, and goals • When and where to go in labor | <ul style="list-style-type: none"> • Review of hospital discharge plan |
| Interventions to Reduce Psychosocial Risk | | | |
| Substance Abuse Counseling and Referral to Other Programs | <ul style="list-style-type: none"> • Smoking cessation • Alcohol avoidance • Avoidance of illicit drugs | <ul style="list-style-type: none"> • Smoking cessation • Alcohol avoidance • Illicit drug avoidance | |
| Nutrition Supplementation and Referral | <ul style="list-style-type: none"> • Counseling to improve adequacy of diet • Vitamin and iron supplementation on indication • Supplemental food programs on indication | <ul style="list-style-type: none"> • Counseling to improve adequacy of diet • Vitamin and iron supplementation on indication • Supplemental food programs on indication | <ul style="list-style-type: none"> • Vitamin-mineral supplement for those at nutritional risk • Referral to lactation consultant if breastfeeding |
| Program of Home Visits | <ul style="list-style-type: none"> • Need for home visits identified • Type and timing of home visit needed | <ul style="list-style-type: none"> • Decision on need for home visits • Schedule of home visits on indication | <ul style="list-style-type: none"> • Home visit or follow up telephone conference within 48 hours of discharge |
| Social and Financial Resources | <ul style="list-style-type: none"> • Enrollment in medical assistance program on indication • Assistance with housing on indication • Referrals for social support, counseling, etc. | <ul style="list-style-type: none"> • Assistance with housing on indication • Referrals for social support, counseling, etc. | <ul style="list-style-type: none"> • Referrals for social support, counseling, etc. |
| Other Referrals | <ul style="list-style-type: none"> • Home health agency • Community mental health center • Safe shelter | <ul style="list-style-type: none"> • Home health agency • Community mental health center • Safe shelter | <ul style="list-style-type: none"> • Community mental health center |
| Interventions to Reduce Medical Risk | | | |
| Treatment of Existing Illness | | | |
| Referral and Consultation with other specialized providers as indicated | <ul style="list-style-type: none"> • Medical - internist, surgeon, etc. • Genetic counselor • Dentist • Home health agency, community health nurse • Maternal or fetal specialist • Pediatrician | <ul style="list-style-type: none"> • General medical • Dental • Community outreach program, home health • Perinatal or obstetric • Community mental health center • Pediatric • Other specialists | <ul style="list-style-type: none"> • General medical • Dental • Community outreach program, home health • Perinatal or obstetric • Pediatric • Other specialists |

| Actividades de la Evaluación de los Riesgos | Preconcepción o Primera Visita durante el Embarazo | Visita Prenatal Rutinaria | Atención Rutinaria después del Parto |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Antecedentes | <ul style="list-style-type: none"> • Sociodemográfica • Psicológica • Menstrual/ginecológica • Anticonceptiva y sexual • Posobstétrica • Médica y quirúrgica • Genética: Individual, conyugal y familiar • Nutrición • Del Comportamiento • Ambiental y/o peligros en el trabajo • Embarazo actual hasta la fecha | <ul style="list-style-type: none"> • Antecedentes de embarazos hasta la fecha • Problemas o señales de peligro desde la última visita • Habilidad para seguir recomendaciones y tratamientos | <ul style="list-style-type: none"> • Poner al día el estado físico y psicosocial de la madre y del recién nacido |
| Examen Físico | <ul style="list-style-type: none"> • Nutrición y apariencia general • Presión Arterial, pulso • Perfil de altura y peso; peso actual • Cabeza y cuello • Corazón y pulmones • Senos • Abdomen • Sensibilidad en el área pélvica • Extremidades y espalda • Neuromuscular • Examen Pélvico | <ul style="list-style-type: none"> • Nutrición y apariencia general • Presión Arterial, pulso • Peso, incluyendo el patrón del aumento de peso • Evaluación del abdomen (Vea la evaluación del feto) • Examen de la cerviz después de las 40 semanas | <ul style="list-style-type: none"> • Programar una visita después del parto con un profesional médico de 3 a 8 semanas después de dar a luz • Características Generales de Estatura y Peso • Examen Pélvico y Pelvimetría • Examen de los Senos • Examen Cervical |
| Pruebas de Laboratorio | <ul style="list-style-type: none"> • Hemoglobina o Hematócrito • Rh en la sangre, factor negativo de Rh, prueba de anticuerpos • Factor de la Rubéola • Serología • "Pap Smear" (prueba del cáncer en la cerviz) • Prueba de proteína y glucosa en la sangre • Prueba de gonorrea • Prueba de la orina para la infección del tracto urinario y para la enfermedad de los riñones • Título de Hepatitis B • Título de la VIH • Toxicología de las drogas • Pruebas según sean indicadas para toxoplasmosis, tuberculosis, herpes simple, varicella, clamidia, enfermedades en la hemoglobina y Tay Sachs | <ul style="list-style-type: none"> • Feto-alfaproteína y suero materno • Repetir la prueba de hemoglobina o hematócrito • Prueba de la diabetes • Serología • Otras pruebas según sean indicadas | <ul style="list-style-type: none"> • Vacuna de rubéola, si es susceptible a la infección del virus de la rubéola después • Medida de la hemoglobina o del hematócrito del parto • Si se conocen y se indican el tipo de Rh D y el grupo ABO de la sangre, se administra la cantidad de globulina de inmunidad anti-D |
| Evaluación del Feto | <ul style="list-style-type: none"> • Confirmar la edad gestacional ("LMP, tamaño del útero") • Auscultación del corazón del feto después de 8 semanas | <ul style="list-style-type: none"> • Confirmar el tiempo de la gestación • Medidas de la altura fúndica para el crecimiento fetal • Cómo está acostado el feto, su posición, presentación y el peso del mismo, al acercarse el final del tiempo de gestación | |
| Actividades para el Fomento de la Salud Orientación para Fomentar y Apoyar Bebés Saludables | <ul style="list-style-type: none"> • Nutrición • Dejar de fumar • Evitar el alcohol • Importancia del ácido fólico • Evitar las drogas ilícitas • Evitar los teratógenos • Relaciones sexuales más seguras | <ul style="list-style-type: none"> • Nutrición • Evitar los teratógenos • Utilización de los cinturones de seguridad por la madre • Relaciones sexuales más seguras • Apoyo para dejar de fumar • Consejos para el trabajo | <ul style="list-style-type: none"> • Orientación después del parto • Actividades y ejercicios después del parto • Molestias comunes después del parto y métodos de alivio • Orientación sobre la nutrición, especialmente si la madre está alimentando al pecho materno, es decir, lactancia materna • Depresión después del parto *Realizar el Examen de Detección de la Depresión después del Parto, si parece indicado • Orientación para atender al recién nacido • Cómo utilizar el asiento seguridad en los carros para los bebés • Cómo bañar a los recién nacidos • Cómo cuidar el cordón umbilical • Apoyo familiar al darle de alta • Planificación familiar |

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Conocimiento General de Embarazos y de Cómo ser Mejores Padres</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Cambios fisiológicos y emocionales del embarazo • Consejos para la sexualidad • Crecimiento y desarrollo fetal • Estrategias de autoayuda para molestias comunes • Clases al principio del embarazo | <ul style="list-style-type: none"> • Cambios fisiológicos y emocionales durante el embarazo • Consejos sobre la sexualidad • Crecimiento y desarrollo fetal, patrones de la actividad • Hábitos generales de la salud • Estrategias de autoayuda para molestias comunes • Promoción de la alimentación dándole el pecho a los bebés • Seguridad en los asientos • Clases de preparación para el parto • Clases de preparación para ser madre o padre • Se hagan preguntas acerca del parto y de los dolores del parto • Repaso del cuidado de los bebés • El papel de la familia y el proceso de adaptación a la nueva situación | <ul style="list-style-type: none"> • Prevención de SIDS (del Síndrome de Muerte Repentina del Bebé) • Planificación familiar • Educación sobre cómo ser mejores padres • Hábitos generales para la buena salud • Apoyo a las madres lactantes • Seguridad usando los asientos seguridad en los carros para los bebés y los niños • Papeles familiares y adaptaciones |
| <p>Información sobre los Cuidados que hay que Dar</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Necesidad de entrar anticipadamente al cuidado prenatal • Preparación para las pruebas específicas y diagnósticas • Contenido y programa de las visitas prenatales • Necesidad de reportar inmediatamente las señales de peligro | <ul style="list-style-type: none"> • Patrón y contenido de las visitas • Pruebas de laboratorio • Necesidad de reportar las señales de peligro • Señales y síntomas de dolores del parto antes del final del período de gestación • Plan del parto, expectativas y metas • Cuándo y dónde ir cuando empiezan los dolores del parto | <ul style="list-style-type: none"> • Repaso del plan para darle de alta del hospital |
| <p>Intervenciones para Reducir los Riesgos Psicosociales</p> | | | |
| <p>Terapia de Consejos para el Abuso de Sustancias Adictivas y Referencias a Otros Programas</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Dejar de fumar • Evitar el alcohol • Evitar las drogas ilícitas | <ul style="list-style-type: none"> • Dejar de fumar • Evitar el alcohol • Evitar las drogas ilícitas | |
| <p>Suplemento para la Nutrición y Referencias</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Suplementos de vitaminas y de hierro según indique el médico • Consejos para mejorar la suficiencia de la dieta • Programas de alimentos según sean necesarios y cómo indique el médico | <ul style="list-style-type: none"> • Consejos para mejorar la suficiencia de la dieta • Suplementos de vitaminas y de hierro según indique el médico • Programas de alimentos según sean necesarios y cómo indique el médico | <ul style="list-style-type: none"> • Suplementos de vitaminas y minerales para los que estén en peligro con respecto a la nutrición • Referencia a una consultora de lactancia si está alimentando al pecho materno |
| <p>Programa de Visitas al Hogar</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Se identifica la necesidad para las visitas en el hogar • Tipo y programa de las visitas necesarias en el hogar | <ul style="list-style-type: none"> • Decisión sobre la necesidad de las visitas en el hogar • Programa de las visitas en el hogar según indique el médico | <ul style="list-style-type: none"> • Visita en el hogar o llamada telefónica dentro de 48 horas después de que le den de alta |
| <p>Recursos Sociales y Económicos</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Inscripción en un programa de ayuda económica para asuntos médicos según indique el médico • Ayuda para encontrar alojamiento según indique el médico • Referencias para recibir apoyo social, consejos, etc. | <ul style="list-style-type: none"> • Ayuda para encontrar alojamiento según indique el médico • Referencias para recibir apoyo social, consejos, etc. | <ul style="list-style-type: none"> • Referencias para recibir apoyo social, orientación, etc. |
| <p>Otras Referencias</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Agencia para el cuidado de la salud en el hogar • Centro de salud mental comunitario • Alojamiento seguro | <ul style="list-style-type: none"> • Agencia para el cuidado de la salud en el hogar • Centro de salud mental comunitario • Alojamiento seguro | <ul style="list-style-type: none"> • Centro para la salud mental en la comunidad |
| <p>Intervenciones para Reducir los Riesgos Médicos</p> | | | |
| <p>Tratamiento para las Enfermedades que ya Existen</p> | | | |
| <p>Referencias y Consultas con otros proveedores especializados, si parece indicado</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Médica: Internista, cirujano, etc. • Consejero genético • Dentista • Pediatra • Agencia para el cuidado de la salud en el hogar, centro de salud mental comunitario • Especialista maternal o feta | <ul style="list-style-type: none"> • Médico general • Dental • Programa comunitario de extensión, cuidado de la salud en el hogar • Obstétrico o referente al nacimiento del bebé • Centro de salud mental comunitario • Pediatra • Otros especialistas | <ul style="list-style-type: none"> • Medicina general • Cuidados dentales • Programa de extensión en la comunidad y de salud en el hogar • Cuidados perinatales u obstétricos • Pediatría • Otros especialistas |