

	Chlamydia	Gonorrhea	Genital Warts (HPV)	Vaginitis (Trich)
Symptoms	Abnormal genital discharge. Burning or pain when you urinate (pee). Bleeding between periods. Pain in abdomen.	Pain when you urinate (pee). Abnormal discharge from genitals. Most men and women don't have symptoms.	Small, painless warts on the sex organs and anus. Itching or burning around the sex organs.	Itching, burning or pain in the vagina. Discharge that smells or looks different.
How do you get it?	It is spread during unprotected sex with someone who is infected.	It is spread during unprotected sex with someone who is infected.	It is spread during unprotected sex with someone who is infected. There are over 40 types of HPV.	It is spread during unprotected sex with someone who is infected. Men can carry it without any symptoms.
If you are not treated	You can infect others. Both men and women may no longer be able to have children. A mother can give it to her baby during childbirth.	You can infect others. Both men and women may no longer be able to have children. A mother can give it to her baby during childbirth. It can cause trouble with the heart, disease of the skin, arthritis and blindness.	You can infect others. Some types of HPV causes cervical and other genital cancers. There is a vaccine to prevent HPV infection.	You can infect others. It can increase the risk for other infections. It may cause premature delivery and birth. Men can get infections in the prostate gland.
	Hepatitis B	Herpes	Syphilis	HIV/AIDS
Symptoms	Flu-like feeling. Feeling tired. Yellow skin (jaundice). Dark urine and light colored bowel movements. Many people do not have symptoms.	Flu-like feeling. Small, painful blisters on the sex organs. Blisters go away but you will always have Herpes. Blisters can come back.	Stage 1: Sores (cankers) on the sex organs, breasts or fingers. Sores go away, but you still have Syphilis. Stage 2: Skin rash on the palms or hands and soles of feet. Rash goes away, but you still have Syphilis.	Can go many years without symptoms. Unexplained weight loss. Flu-like feeling that does not go away. Diarrhea. White spots in the mouth. Yeast infections that do not go away.
How do you get it?	It is spread during unprotected sex with someone who is infected. It is spread by sharing needles to inject drugs or getting tattoos with used needles. Contact with infected blood.	It is spread during unprotected sex with someone who is infected.	It is spread during unprotected sex with someone who is infected.	It is spread during unprotected sex with someone who is infected. By sharing needles to inject drugs or getting tattoos with used needles. Contact with infected blood.
If you are not treated	You can infect others. There are no medicines for treating Hepatitis B. Some people recover on their own. Some people cannot be cured. Their symptoms may go away, but they can still infect others. It can cause damage to the liver. A pregnant mother can give it to her baby during childbirth.	You can infect others. Herpes cannot be cured. A pregnant mother can give it to her baby during childbirth.	You can infect others. Syphilis can be cured and complications avoided if treated early. A pregnant mother can give it to her baby during childbirth. If not treated, syphilis can cause heart disease, blindness, brain damage and death.	HIV cannot be cured. You can infect others. It can cause illness and death. A mother with HIV can give it to her baby in the womb, during birth or while breastfeeding.

Los hechos sobre las ITS

	Clamidia	Gonorrea	Verrugas genitales (VPH)	Vaginitis (Tricomoniasis)
Síntomas	Supuración genital anormal. Ardor o dolor cuando orina. Sangrado intermitente entre menstruación. Dolor de abdomen.	Dolor cuando orina. Supuración anormal de los genitales. La mayoría de los hombres y mujeres no presentan síntomas.	Verrugas pequeñas que no causan dolor en los genitales y el ano. Comezón o ardor en el área de los genitales.	Comezón, ardor o dolor en la vagina. Supuración que tiene un olor o apariencia diferente.
¿Cómo se contrae?	Se transmite cuando tiene sexo sin protección con una persona que está infectada.	Se transmite cuando tiene sexo sin protección con una persona que está infectada.	Se transmite cuando tiene sexo sin protección con una persona que está infectada. Existen más de 40 tipos del VPH.	Se transmite cuando tiene sexo sin protección con una persona que está infectada. Los hombres pueden tenerlo sin presentar síntomas.
Si no recibe tratamiento	Puede infectar a otras personas. Los hombres y mujeres pueden perder la capacidad de tener niños. Una madre se lo puede transmitir a su bebé durante el parto.	Puede infectar a otras personas. Los hombres y mujeres pueden perder la capacidad de tener niños. Una madre se lo puede transmitir a su bebé durante el parto. Puede causar problemas del corazón, enfermedad de la piel, artritis y ceguera.	Puede infectar a otras personas. Algunos tipos del VPH causan el cáncer del cuello uterino y otros tipos de cánceres genitales. Existe una vacuna para prevenir la infección del VPH.	Puede infectar a otras personas. Puede aumentar el riesgo para otras infecciones. Puede causar un parto y nacimiento prematuro. Los hombres pueden desarrollar infecciones en la glándula de la próstata.
	Hepatitis B	Herpes	Sífilis	VIH/SIDA
Síntomas	Síntomas parecidos a la gripe. Cansancio. Piel amarillenta (ictericia). Orina oscura o heces fecales de color claro. Muchas personas no presentan síntomas.	Síntomas parecidos a la gripe. Ampollas pequeñas y dolorosas en los genitales. Las ampollas desaparecen, pero siempre tendrá la herpes. Las ampollas pueden aparecer de nuevo.	Etapa 1: Llagas (úlceras) en los genitales, senos o dedos. Las llagas desaparecen, pero aún tendrá sífilis. Etapa 2: Sarpullido en las palmas de las manos o en las manos y las plantas de los pies. El sarpullido desaparece, pero aún tendrá sífilis.	Pueden pasar varios años sin presentar síntomas. Pérdida de peso sin explicación. Síntomas parecidos a la gripe que no se resuelven. Diarrea. Manchas blancas en la boca. Candidiasis que no se resuelve.
¿Cómo se contrae?	Se transmite cuando tiene sexo sin protección con una persona que está infectada. Se transmite cuando se comparten agujas para inyectarse drogas o hacerse tatuajes con agujas usadas. Contacto con sangre infectada.	Se transmite cuando tiene sexo sin protección con una persona que está infectada.	Se transmite cuando tiene sexo sin protección con una persona que está infectada.	Se transmite cuando tiene sexo sin protección con una persona que está infectada. Se transmite cuando se comparten agujas para inyectarse drogas o hacerse tatuajes con agujas usadas. Contacto con sangre infectada.
Si no recibe tratamiento	Puede infectar a otras personas. No existen medicamentos para el tratamiento de la Hepatitis B. Algunas personas se recuperan por sí solas. Algunas personas no se pueden curar. Sus síntomas pueden desaparecer, pero aún pueden infectar a otras personas. Puede causar daño al hígado. Una madre se lo puede transmitir a su bebé durante el parto.	Puede infectar a otras personas. La herpes no se puede curar. Una madre se lo puede transmitir a su bebé durante el parto.	Puede infectar a otras personas. La sífilis se puede curar y se pueden evitar complicaciones si recibe tratamiento durante su etapa temprana. Una madre se lo puede transmitir a su bebé durante el parto. Si no recibe tratamiento, la sífilis puede causar enfermedades del corazón, ceguera, daños cerebrales y muerte.	El VIH no se puede curar. Puede infectar a otras personas. Puede causar enfermedad y ser mortal. Una madre con el VIH se lo puede transmitir a su bebé en el útero, durante el parto o cuando amamanta.