

Medicaid HEDIS® Índices anuales: 2018-2020

A continuación se muestran los puntajes de los últimos tres años de Molina. Puede ver el desempeño de Molina en comparación con nuestra meta objetivo.

Medición/elemento de datos	2018	2019	2020	Meta 2020
Cumplimiento con medicamentos antipsicóticos para personas con esquizofrenia (SAA)	68.36 %	72.06 %	69.52%	67.47%
Evaluación de IMC en adultos (ABA)	88.37 %	92.94 %	93.67%	93.67%
Visitas dentales anuales (ADV)	NB	NB	NB	64.11%
Control de medicamentos antidepresivos (AMM) Tratamiento en fase de continuación eficaz	36.92 %	38.80 %	41.87%	40.95%
Prueba adecuada para faringitis (CWP)	57.21 %	54.12 %	46.59%	86.51%
Tratamiento adecuado para Infección de las vías respiratorias superiores (URI)	92.96 %	93.12 %	90.21%	94.88%
Índice de medicamento para el asma (AMR) Índice total	60.16 %	58.83 %	56.22%	68.52%
Evitar el tratamiento antibiótico para la bronquitis / bronquiolitis aguda (AAB)	35.72 %	34.54 %	48.51%	41.07%
Examen de detección de cáncer de mama (BCS)	62.18 %	62.60 %	60.45%	63.98%
Examen de detección de cáncer cervical (CCS)	60.51 %	63.26 %	58.88%	66.49%
Estado de vacunación infantil (CIS) Combinación n.º 10	36.74 %	36.01 %	38.44%	42.02%
Examen de detección de clamidia en mujeres (CHL) total	67.21 %	67.17 %	65.11%	66.24%
Atención de diabetes integral (CDC) Control de presión arterial <140/90	67.64 %	70.07 %	67.40%	71.44%
Atención de diabetes integral (CDC) Control de HbA1c <8.0 %	54.99 %	53.04 %	51.09%	55.96%
Atención de diabetes integral (CDC) Examen ocular	60.58 %	60.10 %	60.83%	64.72%
Control de presión arterial alta (CBP)	59.51 %	66.67 %	61.31%	66.91%
Examen de detección de diabetes para personas con esquizofrenia o trastorno bipolar que tomen medicamentos antipsicóticos (SSD)	80.08 %	81.09 %	80.95%	84.27%
Seguimiento después de la visita al departamento de emergencias por abuso o dependencia de alcohol y otras drogas (FUA) Índice solo para 7 días	NB	NB	NB	16.93%
Seguimiento después de la visita al departamento de emergencias por enfermedad mental (FUM) Índice solo para 7 días	NB	NB	NB	49.65%
Seguimiento después de hospitalización por enfermedad mental (FUH) Índice solo para 7 días	NB	NB	NB	42.69%
Seguimiento para niños con medicamento recetado para el trastorno de déficit de atención con hiperactividad (ADD) Fase de continuación	29.06 %	43.24 %	39.81%	62.69%
Vacunas para adolescentes (IMA) Combinación n.º 2	36.98 %	36.74 %	36.98%	40.39%

NA = No disponible por denominador menor

NB = Sin beneficios

NR = No se informó

\* Tasa reportada calculada por 1000 miembros

NQ = No requerido

BR = Índice sesgado

Medición/elemento de datos	2018	2019	2020	Meta 2020
Inicio y participación en tratamiento por adicción al alcohol y otras drogas (IET) Participación en tratamiento para alcohol y otras drogas AOD Índice total	4.92 %	4.46 %	4.01%	18.12%
Control de medicamento para personas con asma (MMA) Cumplimiento total con medicamentos índice del 75 % solamente	39.53 %	34.87 %	40.31%	42.77%
Control metabólico para niños y adolescentes que toman antipsicóticos (APM)	NA	NA	NA	40.90%
Control de farmacoterapia de exacerbación del EPOC (PCE) - corticosteroides sistémicos	66.56 %	68.06 %	68.35%	75.38%
Control de farmacoterapia de exacerbación del EPOC (PCE) - broncodilatador	81.91 %	86.27 %	83.06%	87.93%
Atención prenatal y posparto (PPC) Puntualidad de la atención prenatal	80.00 %	83.94 %	95.62%	87.59%
Atención prenatal y posparto (PPC) Atención posparto	63.04 %	69.83 %	75.91%	69.83%
Terapia con estatinas para pacientes con enfermedad cardiovascular (SPC) Terapia con estatinas recibida	77.59 %	80.00 %	80.78%	81.24%
Terapia con estatinas para pacientes con enfermedad cardiovascular (SPC) Cumplimiento con las estatinas 80 %	65.58 %	72.81 %	71.87%	69.97%
Terapia con estatinas para pacientes con diabetes (SPD) Terapia con estatinas recibida	66.63 %	67.51 %	68.76%	67.19%
Terapia con estatinas para pacientes con diabetes (SPD) Cumplimiento con las estatinas 80 %	59.70 %	66.45 %	65.35%	66.42%
Uso de atención psicosocial de primera línea para niños y adolescentes que toman antipsicóticos (APP)	NA	NA	NA	66.58%
Uso de estudios de diagnóstico por imágenes para lumbalgia (LBP)	71.10 %	70.67 %	72.77%	76.02%
Uso de opioides en dosis altas (HDO)	37.79*	2.93%	3.92%	≤ 2.27%
Uso de opioides de múltiples proveedores (UOP) Prescriptores múltiples y farmacias múltiples	36.00*	3.12%	2.61%	≤ 2.14%
Evaluación del peso y asesoramiento nutricional y de actividad física para niños/adolescentes (WCC) Examen de IMC total	89.14 %	83.45 %	86.37%	85.16%

NA = No disponible por denominador menor

NB = Sin beneficios

NR = No se informó

\* Tasa reportada calculada por 1000 miembros

NQ = No requerido

BR = Índice sesgado