

Molina Healthcare of Florida

Medicaid HEDIS® Índices Anuales: 2018-2020

A continuación se muestran los puntajes de los últimos tres años de Molina. Puede ver el desempeño de Molina en comparación con nuestra meta objetivo.

| Medición/elemento de datos | 2018 | 2019 | 2020 | Meta 2020 |
|---|--------|--------|--------|-----------|
| Cumplimiento con medicamentos antipsicóticos para personas con esquizofrenia (SAA) | 57.54% | 60.95% | 64.42% | 67.47% |
| Evaluación de IMC en adultos (ABA) | 88.21% | 90.75% | 96.86% | 93.67% |
| Visitas dentales anuales (ADV) | 50.06% | 48.48% | NB | 64.11% |
| Control de medicamentos antidepresivos (AMM) Tratamiento en fase de continuación eficaz | 36.02% | 39.37% | 41.53% | 40.95% |
| Prueba adecuada para faringitis (CWP) | 72.98% | 70.09% | 70.10% | 86.51% |
| Tratamiento adecuado para Infección de las vías respiratorias superiores (URI) | 89.51% | 90.18% | 87.53% | 94.88% |
| Índice de medicamento para el asma (AMR) Índice total | 63.95% | 71.33% | 81.82% | 68.52% |
| Evitar el tratamiento antibiótico para la bronquitis / bronquiolitis aguda (AAB) | 28.16% | 31.84% | 57.97% | 41.07% |
| Examen de detección de cáncer de mama (BCS) | 65.18% | 60.91% | 69.21% | 63.98% |
| Examen de detección de cáncer cervical (CCS) | 63.99% | 56.93% | 63.26% | 66.49% |
| Estado de vacunación infantil (CIS) Combinación n.º 10 | 27.25% | 24.82% | 38.05% | 42.02% |
| Examen de detección de clamidia en mujeres (CHL) total | 63.90% | 64.67% | 67.81% | 66.24% |
| Atención de diabetes integral (CDC) Control de presión arterial <140/90 | 52.07% | 54.26% | 71.05% | 71.44% |
| Atención de diabetes integral (CDC) Control de HbA1c <8.0 % | 48.91% | 40.88% | 56.93% | 55.96% |
| Atención de diabetes integral (CDC) Examen ocular | 58.15% | 58.15% | 65.21% | 64.72% |
| Control de presión arterial alta (CBP) | 50.36% | 54.74% | 72.13% | 66.91% |
| Examen de detección de diabetes para personas con esquizofrenia o trastorno bipolar que tomen medicamentos antipsicóticos (SSD) | 82.89% | 83.06% | 85.74% | 84.27% |
| Seguimiento después de la visita al departamento de emergencias por abuso o dependencia de alcohol y otras drogas (FUA) Índice solo para 7 días | 3.73% | 5.60% | 5.92% | 16.93% |
| Seguimiento después de la visita al departamento de emergencias por enfermedad mental (FUM) Índice solo para 7 días | 21.44% | 25.81% | 22.39% | 49.65% |
| Seguimiento después de hospitalización por enfermedad mental (FUH) Índice solo para 7 días | 28.54% | 31.53% | 38.83% | 42.69% |
| Seguimiento para niños con medicamento recetado para el trastorno de déficit de atención con hiperactividad (ADD) Fase de continuación | 60.47% | 71.07% | 62.59% | 62.69% |
| Vacunas para adolescentes (IMA) Combinación n.º 2 | 28.71% | 32.85% | 43.41% | 40.39% |

NA = No disponible por denominador menor

NB = Sin beneficios

NR = No se informó

* Tasa reportada calculada por 1000 miembros

NQ = No requerido

BR = Índice sesgado

| Medición/elemento de datos | 2018 | 2019 | 2020 | Meta 2020 |
|--|--------|--------|--------|-----------|
| Inicio y participación en tratamiento por adicción al alcohol y otras drogas (IET) Participación en tratamiento para alcohol y otras drogas AOD Índice total | 6.55% | 6.70% | 7.45% | 18.12% |
| Control de medicamento para personas con asma (MMA) Cumplimiento total con medicamentos índice del 75 % solamente | 29.05% | 33.90% | 32.79% | 42.77% |
| Control metabólico para niños y adolescentes que toman antipsicóticos (APM) | 39.06% | 40.58% | 44.55% | 40.90% |
| Control de farmacoterapia de exacerbación del EPOC (PCE) - corticosteroides sistémicos | 69.05% | 69.95% | 68.53% | 75.38% |
| Control de farmacoterapia de exacerbación del EPOC (PCE) - broncodilatador | 88.64% | 85.57% | 91.37% | 87.93% |
| Atención prenatal y posparto (PPC) Puntualidad de la atención prenatal | 84.05% | 85.16% | 99.03% | 87.59% |
| Atención prenatal y posparto (PPC) Atención posparto | 67.09% | 65.94% | 77.13% | 69.83% |
| Terapia con estatinas para pacientes con enfermedad cardiovascular (SPC) Terapia con estatinas recibida | 71.99% | 77.79% | 79.77% | 81.24% |
| Terapia con estatinas para pacientes con enfermedad cardiovascular (SPC) Cumplimiento con las estatinas 80 % | 58.29% | 66.73% | 64.59% | 69.97% |
| Terapia con estatinas para pacientes con diabetes (SPD) Terapia con estatinas recibida | 62.70% | 67.42% | 76.06% | 67.19% |
| Terapia con estatinas para pacientes con diabetes (SPD) Cumplimiento con las estatinas 80 % | 53.67% | 63.28% | 60.66% | 66.42% |
| Uso de atención psicosocial de primera línea para niños y adolescentes que toman antipsicóticos (APP) | 62.63% | 64.99% | 77.39% | 66.58% |
| Uso de estudios de diagnóstico por imágenes para lumbalgia (LBP) | 61.53% | 63.25% | 66.41% | 76.02% |
| Uso de opioides en dosis altas (HDO) | 59.30* | 5.07% | 13.55% | ≤ 2.27% |
| Uso de opioides de múltiples proveedores (UOP) Prescriptores múltiples y farmacias múltiples | 51.01* | 3.76% | 2.04% | ≤ 2.14% |
| Evaluación del peso y asesoramiento nutricional y de actividad física para niños/adolescentes (WCC) Examen de IMC total | 85.54% | 84.67% | 89.74% | 85.16% |

El año que se reporta es subsecuente al año reflejado en la data; por ejemplo, la data denominada “HEDIS 2020” se obtiene durante los meses de enero-diciembre del año 2019.

NA = No disponible por denominador menor

NB = Sin beneficios

NR = No se informó

* Tasa reportada calculada por 1000 miembros

NQ = No requerido

BR = Índice sesgado