

Molina Healthcare of Michigan

Medicaid HEDIS® Índices anuales: 2018-2020

A continuación se muestran los puntajes de los últimos tres años de Molina. Puede ver el desempeño de Molina en comparación con nuestra meta objetivo.

Medición/elemento de datos	2018	2019	2020	Meta 2020
Cumplimiento con medicamentos antipsicóticos para personas con esquizofrenia (SAA)	64.74%	64.60%	41.22%	67.47%
Evaluación de IMC en adultos (ABA)	96.00%	93.19%	94.17%	93.67%
Visitas dentales anuales (ADV)	36.14%	28.98%	30.82%	64.11%
Control de medicamentos antidepresivos (AMM) Tratamiento en fase de continuación eficaz	37.54%	40.40%	26.47%	40.95%
Prueba adecuada para faringitis (CWP)	75.12%	76.39%	66.65%	86.51%
Tratamiento adecuado para Infección de las vías respiratorias superiores (URI)	87.40%	89.95%	84.57%	94.88%
Índice de medicamento para el asma (AMR) Índice total	63.06%	60.16%	55.87%	68.52%
Evitar el tratamiento antibiótico para la bronquitis / bronquiolitis aguda (AAB)	33.02%	34.92%	47.10%	41.07%
Examen de detección de cáncer de mama (BCS)	61.50%	59.49%	59.27%	63.98%
Examen de detección de cáncer cervical (CCS)	72.34%	67.40%	67.40%	66.49%
Estado de vacunación infantil (CIS) Combinación n.º 10	31.31%	33.82%	33.82%	42.02%
Examen de detección de clamidia en mujeres (CHL) total	67.35%	68.09%	67.64%	66.24%
Atención de diabetes integral (CDC) Control de presión arterial <140/90	51.11%	61.56%	64.96%	71.44%
Atención de diabetes integral (CDC) Control de HbA1c <8.0 %	54.55%	49.15%	52.07%	55.96%
Atención de diabetes integral (CDC) Examen ocular	62.16%	59.37%	58.88%	64.72%
Control de presión arterial alta (CBP)	51.82%	54.01%	61.61%	66.91%
Examen de detección de diabetes para personas con esquizofrenia o trastorno bipolar que tomen medicamentos antipsicóticos (SSD)	85.87%	85.98%	84.56%	84.27%
Seguimiento después de la visita al departamento de emergencias por abuso o dependencia de alcohol y otras drogas (FUA) Índice solo para 7 días	NB	5.17%	NB	16.93%
Seguimiento después de la visita al departamento de emergencias por enfermedad mental (FUM) Índice solo para 7 días	NB	10.32%	14.97%	49.65%
Seguimiento después de hospitalización por enfermedad mental (FUH) Índice solo para 7 días	NB	NB	NB	42.69%
Seguimiento para niños con medicamento recetado para el trastorno de déficit de atención con hiperactividad (ADD) Fase de continuación	37.54%	68.20%	47.17%	62.69%
Vacunas para adolescentes (IMA) Combinación n.º 2	31.94%	38.20%	42.09%	40.39%

NA = No disponible por denominador menor

NB = Sin beneficios

NR = No se informó

* Tasa reportada calculada por 1000 miembros

NQ = No requerido

BR = Índice sesgado

Medición/elemento de datos	2018	2019	2020	Meta 2020
Inicio y participación en tratamiento por adicción al alcohol y otras drogas (IET) Participación en tratamiento para alcohol y otras drogas AOD Índice total	NB	4.91%	NB	18.12%
Control de medicamento para personas con asma (MMA) Cumplimiento total con medicamentos índice del 75 % solamente	38.56%	34.84%	33.57%	42.77%
Control metabólico para niños y adolescentes que toman antipsicóticos (APM)	29.32%	30.16%	28.88%	40.90%
Control de farmacoterapia de exacerbación del EPOC (PCE) - corticosteroides sistémicos	74.55%	74.58%	75.49%	75.38%
Control de farmacoterapia de exacerbación del EPOC (PCE) - broncodilatador	89.07%	89.05%	89.67%	87.93%
Atención prenatal y posparto (PPC) Puntualidad de la atención prenatal	77.32%	71.05%	97.81%	87.59%
Atención prenatal y posparto (PPC) Atención posparto	73.80%	67.64%	77.86%	69.83%
Terapia con estatinas para pacientes con enfermedad cardiovascular (SPC) Terapia con estatinas recibida	75.95%	76.17%	78.72%	81.24%
Terapia con estatinas para pacientes con enfermedad cardiovascular (SPC) Cumplimiento con las estatinas 80 %	61.05%	66.20%	66.91%	69.97%
Terapia con estatinas para pacientes con diabetes (SPD) Terapia con estatinas recibida	66.24%	65.33%	69.68%	67.19%
Terapia con estatinas para pacientes con diabetes (SPD) Cumplimiento con las estatinas 80 %	60.66%	63.53%	64.39%	66.42%
Uso de atención psicosocial de primera línea para niños y adolescentes que toman antipsicóticos (APP)	NB	NB	NB	66.58%
Uso de estudios de diagnóstico por imágenes para lumbalgia (LBP)	72.99%	73.02%	74.82%	76.02%
Uso de opioides en dosis altas (HDO)	21.38*	1.57%	2.29%	≤ 2.27%
Uso de opioides de múltiples proveedores (UOP) Prescriptores múltiples y farmacias múltiples	59.06*	3.37%	2.06%	≤ 2.14%
Evaluación del peso y asesoramiento nutricional y de actividad física para niños/adolescentes (WCC) Examen de IMC total	84.64%	81.27%	85.67%	85.16%

NA = No disponible por denominador menor

NB = Sin beneficios

NR = No se informó

* Tasa reportada calculada por 1000 miembros

NQ = No requerido

BR = Índice sesgado