

Medicaid HEDIS® Índices anuales: 2018-2020

A continuación se muestran los puntajes de los últimos tres años de Molina. Puede ver el desempeño de Molina en comparación con nuestra meta objetivo.

Medición/elemento de datos	2018	2019	2020	Meta 2020
Cumplimiento con medicamentos antipsicóticos para personas con esquizofrenia (SAA)	45.83%	39.47%	38.71%	67.47%
Evaluación de IMC en adultos (ABA)	92.75%	91.73%	92.52%	93.67%
Visitas dentales anuales (ADV)	57.85%	57.42%	58.06%	64.11%
Control de medicamentos antidepresivos (AMM) Tratamiento en fase de continuación eficaz	35.40%	31.62%	31.18%	40.95%
Prueba adecuada para faringitis (CWP)	81.18%	86.34%	82.99%	86.51%
Tratamiento adecuado para Infección de las vías respiratorias superiores (URI)	85.32%	90.27%	89.45%	94.88%
Índice de medicamento para el asma (AMR) Índice total	45.28%	54.33%	56.38%	68.52%
Evitar el tratamiento antibiótico para la bronquitis / bronquiolitis aguda (AAB)	34.29%	36.76%	58.14%	41.07%
Examen de detección de cáncer de mama (BCS)	64.63%	63.43%	59.92%	63.98%
Examen de detección de cáncer cervical (CCS)	70.45%	70.80%	72.02%	66.49%
Estado de vacunación infantil (CIS) Combinación n.º 10	36.24%	34.31%	34.06%	42.02%
Examen de detección de clamidia en mujeres (CHL) Total	63.97%	64.67%	63.22%	66.24%
Atención de diabetes integral (CDC) Control de presión arterial <140/90	64.23%	69.83%	69.83%	71.44%
Atención de diabetes integral (CDC) Control de HbA1c <8.0 %	46.47%	54.50%	54.50%	55.96%
Atención de diabetes integral (CDC) Examen ocular	46.96%	49.39%	49.39%	64.72%
Control de presión arterial alta (CBP)	54.88%	51.82%	55.23%	66.91%
Examen de detección de diabetes para personas con esquizofrenia o trastorno bipolar que tomen medicamentos antipsicóticos (SSD)	81.71%	78.93%	74.67%	84.27%
Seguimiento después de la visita al departamento de emergencias por abuso o dependencia de alcohol y otras drogas (FUA) Índice solo para 7 días	9.23%	11.73%	11.45%	16.93%
Seguimiento después de la visita al departamento de emergencias por enfermedad mental (FUM) Índice solo para 7 días	32.99%	35.60%	42.61%	49.65%
Seguimiento después de hospitalización por enfermedad mental (FUH) Índice solo para 7 días	41.56%	35.35%	44.85%	42.69%

NA = No disponible por denominador menor

NB = Sin beneficios

NR = No se informó

\* Tasa reportada calculada por 1000 miembros

NQ = No requerido

BR = Índice sesgado

Medición/elemento de datos	2018	2019	2020	Meta 2020
Seguimiento para niños con medicamento recetado para el trastorno de déficit de atención con hiperactividad (ADD) Fase de continuación	63.64%	50.00%	47.73%	62.69%
Vacunas para adolescentes (IMA) Combinación n.º 2	37.71%	42.58%	42.58%	40.39%
Inicio y participación en tratamiento por adicción al alcohol y otras drogas (IET) Participación en tratamiento para alcohol y otras drogas AOD Índice total	12.46%	14.40%	17.36%	18.12%
Control de medicamento para personas con asma (MMA) Cumplimiento total con medicamentos índice del 75 % solamente	23.11%	24.31%	30.53%	42.77%
Control metabólico para niños y adolescentes que toman antipsicóticos (APM)	11.69%	8.33%	19.05%	40.90%
Control de farmacoterapia de exacerbación del EPOC (PCE) - corticosteroides sistémicos	81.94%	72.41%	82.86%	75.38%
Control de farmacoterapia de exacerbación del EPOC (PCE) - broncodilatador	87.50%	87.93%	88.57%	87.93%
Atención prenatal y posparto (PPC) Puntualidad de la atención prenatal	81.44%	79.81%	92.70%	87.59%
Atención prenatal y posparto (PPC) Atención posparto	56.70%	59.37%	71.29%	69.83%
Terapia con estatinas para pacientes con enfermedad cardiovascular (SPC) Terapia con estatinas recibida	85.33%	84.51%	83.82%	81.24%
Terapia con estatinas para pacientes con enfermedad cardiovascular (SPC) Cumplimiento con las estatinas 80 %	68.75%	63.33%	64.91%	69.97%
Terapia con estatinas para pacientes con diabetes (SPD) Terapia con estatinas recibida	65.96%	65.38%	67.05%	67.19%
Terapia con estatinas para pacientes con diabetes (SPD) Cumplimiento con las estatinas 80 %	54.44%	62.61%	62.29%	66.42%
Uso de atención psicosocial de primera línea para niños y adolescentes que toman antipsicóticos (APP)	63.64%	57.50%	57.14%	66.58%
Uso de estudios de diagnóstico por imágenes para lumbalgia (LBP)	73.70%	69.88%	75.41%	76.02%
Uso de opioides en dosis altas (UOD)	185.42*	NQ	25.97%	≤ 2.27%
Uso de opioides de múltiples proveedores (UOP) Prescriptores múltiples y farmacias múltiples	121.47*	NQ	2.98%	≤ 2.14%
Evaluación del peso y asesoramiento nutricional y de actividad física para niños/adolescentes (WCC) Examen de IMC total	73.24%	80.29%	75.61%	85.16%

NA = No disponible por denominador menor

NB = Sin beneficios

NR = No se informó

\* Tasa reportada calculada por 1000 miembros

NQ = No requerido

BR = Índice sesgado